

**Tabel 1. IMMUUNOSUPRESSIIVNE RAVI**

RAVIMIKLASS	TOIMEAINE (RAVIM)	PÄEVADOOS	VERENIVOO	KÕRVALTOIME
Kaltsineuriini inhibiitorid	<p><b>Esmavalik</b> – takrolimus (momendil ei ole soodusravimite nimekirjas)</p> <p><b><u>Esmavaliku tingimused:</u></b>                      -korduvsüüdamine                      -kõrge immunoloogiline risk                      PRA&gt; 20%                      -üleviimine tsüklosporiinilt pärast steroidresistentse ägeda äratõuke ravi                      Müokardi infarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt</p>	<p>0-90 POP 0,1mg/kg/päevas 1 kord päevas po</p> <p>&gt;90 POP 0,065–0,12 mg/kg/päevas</p>	<p>5-15ng/ml</p> <p>3-7ng/ml</p>	Neurotoksilisus, treemor, diabeet, hüpertensioon, nefrotoksilisus, seedetraktihäired, hüperlipideemia
	tsüklosporiin A	<p>0-30 POP 6-8mg/kg/päevas jagatuna 2 annuseks po</p> <p>&gt;30 POP &lt;5 mg/kg/päevas jagatuna 2 annuseks po</p>	<p>parandatud: 200-300 ng/ml</p> <p>Co: 80-150 ng/ml</p>	Nefrotoksilisus,kolestaaas,hirsutism, igemete hüperplaasia, neurotoksilisus, lipiidide ainevahetuse häire, diabeet
Kortikosteroidid	<p>Metüülprednisoloon Prednisoloon</p> <p><b>Esmavalikut ei ole</b></p>	<p>0 POP 250 mg-1000 mg i/v 1-2 POP: 250 mg i/v (metüülprednisoloon)</p> <p>3-30 POP 60-8 mg/p po 31-90 POP 4-10 mg/p po &gt;90 POP4-5mg/p või lõpetada</p>		Peptiline haavand, glükoositalerantsushäire, steroiddiabeet, akne, osteoporoos, luunekroos,hüperlipideemia glaukoom, katarakt, hüpertensioon, psühhos
Adjunktiivsed preparaadid	<b>Esmavalik</b> - mükofenoolhape	<p>2000-3000 mg/päevas po (Cellcept) jagatuna 2 annuseks</p> <p>1440-2160mg/päevas po (Myfortic) jagatuna 2 annuseks</p>	<p>2-6 ng/ml</p> <p>2-6 ng/ml</p>	Seedetrakti toksilisus, aneemia, leukopeenia

	Sirolimus	1.päev 6 mg /p po ≥2 päev 2-5 mg/p po	6-12 ng/ml	Trombotsütopeenia, aneemia, hüpokalieemia, kuseteede infektsioon, hüperlipideemia, lümfotsele, hepatoksilisus
	Everoliimus (momendil ei ole soodusravimite nimekirjas)	1,5 mg/päevas po Jagatuna 2 annuseks	3-8 ng/ml	
	Asatiopriin	1-2 mg/kg/p po		Müelotoksilisus, hepatoksilisus

\*POP – neerusiirdamise postop päev. Maksimum päevadoosiks on kõikide toimeainete päevadoosis märgitud suurim võimalik doos