

Table 2: Neerusiirdamise järgne rutiinne patsiendi skriining

Testid	1 nädal	1 kuu	2-3 kuu	4-6 kuu	7-12 kuu	> 12 kuu
Kreatiniin	Iga päev	2-3 x/näd	Iga nädal	2 nädala tagant	Iga kuu	Iga 2-3 kuu tagant
Proteинуuria	1 x/kuus	1 x/kuus	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	1 x/aastas
Täisveri	Iga päev	2-3 x/näd	Iga nädal	Iga kuu	Iga kuu	1 x/aastas
Diabeet	1 x/näd	1 x/näd	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	1 x/aastas
Lipiidid	-	-	1 kord	-	-	1 x/aastas
Suitsetamine	-	Enne haiglast lahkumist	-	-	-	1 x/aastas
BKV NAT	1 x/kuus	1 x/kuus	1 x/kuus	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	-
EBV NAT	1 x/kuus	1 x/kuus	1 x/kuus	1 x 3 kuu tagant	1 x 3 kuu tagant	-
Vererõhk, pulss, pikkus, kehakaal	Igal visiidil	Igal visiidil	Igal visiidil	Igal visiidil	Igal visiidil	Igal visiidil

BKV: BK polyoma virus.

EBV: Epstein-Barr virus.

NAT: nucleic acid testing.

Kreatiniin: Seerumi kreatiniin

Proteинуuria: uriini totaalne valk ja/või uriini albumiin.

Täisveri: valgeverre valem, hemoglobiin ja trombotsüüdid.

Diabeedi skriining: tühjakõhu glükoos, glükoosi tolerantsus test või HbA1c.

Lipiidid: tühjakõhu kolesterool, LDL, HDL ja triglütseriidid.

BKV skriining plasma NAT uuringut kasutades.

EBV skriining plasma NAT uuringut kasutades haigetel, kel pole olnud EBV antikehasid enne siirdamist.